

Caratteristiche comportamentali e neuropsicologiche di un gruppo di pazienti affetti da Sindrome di Tourette pura, Sindrome di Tourette e l'Attention Deficit Hyperactivity Disorder e da Attention Deficit Hyperactivity Disorder puro paragonati ad un gruppo di controllo

R. Rizzo, * P. Curatolo, M. Gulisano, M. Virzì, **MM. Robertson

Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Pediatria Università di Catania Italia (RR, MG, MV)

**Neuropsichiatria Infantile, Università Tor Vergata Roma Italia (PC)*

***Professor of Neuropsychiatry, University College, London (MMR)*

La sindrome di Tourette è associata a numerosi disturbi neuropsicologici e psicopatologici che ne complicano il decorso, il trattamento terapeutico ed hanno ricadute sull' impatto sociale della sindrome. L'attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) è una delle condizioni presenti maggiormente in comorbidità con una incidenza che varia nelle diverse casistiche tra il 50 ed il 90%.

Pazienti e metodi: Allo scopo di analizzare la comorbidità tra TS e ADHD abbiamo studiato un campione costituito da 80 pazienti: 62 maschi, 18 femmine (3-16 anni): 20 affetti da TS pura, 20 con TS+ADHD, 20 con ADHD puro, 20 gruppo controllo.

La diagnosi di TS e ADHD è stata posta seguendo i criteri dell'International Study Group per la sindrome di Tourette e del DSM-IV-TR per l'ADHD. Per la valutazione dei pazienti sono stati utilizzati: CBCL, TSGS, CDI, MASC, Matrici Progressive di Raven, Scale Wechsler.

Risultati: I problemi del comportamento in generale ed i problemi internalizzanti sono risultati significativamente più alti nei gruppi clinici rispetto ai controlli. Inoltre, la differenza tra i gruppi TS+ADHD, e ADHD puro ed il gruppo controllo erano significative in alcune aree. Il profilo cognitivo dei pazienti TS+ADHD presentava deficit simili ai pazienti con ADHD puro, mentre il profilo dei pazienti con TS puro erano più simile a quello del gruppo controllo. Infine tutti e tre i gruppi clinici presentavano maggiori segni depressivi rispetto al gruppo controllo.

Indagine epidemiologica sul disturbo da deficit d' attenzione e iperattività (D.D.A.I.) e comorbidità con difficoltà scolastiche e comportamentali.

rerizzo@unict.it