

## **Confronto tra profili neuropsicologici dei sottotipi ADHD**

M. Romani, M.L. Iorio, R. Penge

*Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell'Età Evolutiva  
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

Gli studi recenti sui sottotipi dell'ADHD hanno evidenziato la presenza di differenze nel deficit funzionale e nella comorbidità associata. Ciononostante, non sono stati ancora individuati profili neuropsicologici distinti per i sottotipi.

Scopo del presente lavoro è quello di confrontare i profili neuropsicologici di bambini non ADHD con quelli di bambini ADHD suddivisi per sottotipo. Si è ipotizzato che tutti i soggetti con componente attentiva prevalente presentassero deficit nelle prove di vigilanza ed elaborazione delle informazioni mentre quelli con iperattività e impulsività prevalente presentassero difficoltà nell'inibizione delle risposte. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione psicopatologica e neuropsicologica completa.

Emerge una mancanza di differenziazione tra i profili neuropsicologici del sottotipo con Disattenzione predominante e quello Combinato che tende a suggerire che i sintomi legati al deficit attentivo, e non quelli legati all'iperattività ed impulsività, siano associati a deficit neuropsicologici.

roberta.penge@uniroma1.it