

Sintomi d'ansia e ADHD: confronto mediante questionari di autovalutazione per ansia e depressione con bambini e adolescenti con disturbo d'ansia e controlli sani.

P. Cavolina, B. Ancilletta, G. Sanna, A. Zuddas

Centro Terapie Farmacologiche in Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Clinica di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimenti di Neuroscienze, Università degli Studi di Cagliari

Numerosi studi riportano una frequente associazione tra il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, (ADHD) ed i disturbi d'ansia: negli ultimi anni, studi europei hanno però messo in dubbio la frequenza di tale associazione, specie nei casi più gravi di ADHD. Scopo del presente studio è verificare, mediante l'uso di due questionari di autovalutazione, la presenza di sintomi d'ansia in bambini ed adolescenti con ADHD (n= 62), rispetto a soggetti con diagnosi formale (*lifetime*) di disturbo d'ansia (n= 23) e controlli sani (n=28). L'analisi delle risposte ai questionari mostra che il punteggio totale alla MASC e quello delle dimensioni "Umiliazione/rigetto", "Parlare in pubblico" e "Panico/ansia di separazione" della stessa scale risultano elevati (almeno 1.5 S rispetto alle norme nord americane) in un numero significativamente maggiore di soggetti con disturbo di ansia, rispetto ai soggetti sani e con ADHD, che risultano non significativamente differenti tra loro. Nessuna differenza significativa tra i tre gruppi e' stata invece riscontrata nei punteggi della CDI. Verranno discusse le implicazioni cliniche della discordanza tra questi risultati e quelli riportati negli studi Nord-Americani.

azuddas@unica.it