

ADHD ed epilessia nell'età evolutiva

A. Ottolini, V. Valenti, S. Merati, M. Lodi*, M. Viri* (*UONPIA e CREI* A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano*)

M. Pezzani, P. Quarti, S. Conte, (*UONPIA A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo*)

A. Tiberti, P. Effedri, L. Chimini, V. Suardi, (*UONPIA A.O. Ospedale Civile di Brescia*)

D. Arisi, L. Bianchini, G. Piccini, (*UONPIA A.O. Cremona*)

I dati riportati in letteratura riguardo la prevalenza del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) sono discordanti in rapporto ai campioni studiati e ai criteri diagnostici utilizzati per la diagnosi di ADHD.

La frequenza di sintomi riferibili a ADHD in bambini seguiti presso centri clinici di riferimento per l'epilessia, è estremamente variabile, con percentuali che vanno dall'8 al 77%. Molti studi fanno riferimento a valutazioni non standardizzate dei sintomi e solo di recente sono stati pubblicati lavori rigorosi dal punto di vista metodologico.

Scopo di questo lavoro è valutare la prevalenza di sintomi riferibili a ADHD su un campione rappresentativo di bambini con epilessia, diagnosticati e seguiti presso quattro U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Milano, Bergamo, Brescia, Cremona).

ottofam@infinito.it